

ANTAGONISTAS DE RECEPTORES BETA ADRENERGICOS O BETABLOQUEADORES



¿Cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo?

Atenolol, Metoprolol, Carvedilol, Bisoprolol, Labetalol, Esmolol.



¿Cómo actúa el medicamento en el cuerpo?

Disminuyen los efectos de hormonas como la Adrenalina en el corazón. Esto hace que el corazón lata más lento y con menos fuerza, reduciendo la presión arterial y mejorando su funcionamiento.



¿Para qué se usa este medicamento?

- Presión arterial alta
- Problemas del ritmo del corazón Arritmias
- Después de un infarto



¿Cuándo NO se debe usar este medicamento?

- Si tienes asma severa
- El ritmo del corazón muy bajo



¿Qué cuidados debes tener al usar este medicamento?

- Evitar suspender el uso sin previa autorización medica
- Controlar la presión y ritmo del corazón de manera frecuente.



Efectos secundarios leves que pueden aparecer

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- cansancio
- sensación de manos frías
- Mareos
- Problemas para dormir
- Disminución del deseo sexual.



Efectos secundarios graves que requieren atención médica


En el 1% de los pacientes (1 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Ritmo cardíaco muy lento.
- Dificultad para respirar (especialmente en personas con asma).
- Alteraciones frecuentes de los niveles de azúcar en sangre en, personas con diabetes.



Interacciones importantes con medicamentos o alimentos

- Evitar usar con otros medicamentos que bajan el ritmo cardíaco (como verapamilo).
- Pueden disminuir el efecto de los medicamentos usados para el tratamiento de la diabetes.



Recomendaciones para el uso de los medicamentos de este grupo

- No suspender de forma brusca.
- Tomar con alimentos.
- Informar al médico si presenta sensación de dificultad respiratoria (asma o broncoespasmo) o problemas de circulación.