

ANTIARRÍTMICOS



¿Cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo?

Amiodarona, Propafenona, Verapamilo, Adenosina, Diltiazem, Dronedarona.



¿Cómo actúa el medicamento en el cuerpo?

Actúa sobre las señales eléctricas del corazón para mantener un ritmo normal. Algunos estabilizan las células del corazón y otros prolongan el tiempo entre los latidos.



¿Para qué se usa este medicamento?

Se indica para tratar los latidos irregulares o rápidos del corazón.



¿Cuándo NO se debe usar este medicamento?

- Insuficiencia cardiaca.
- Si tienes el ritmo del corazón muy lento o ciertos problemas del corazón.



¿Qué cuidados debes tener al usar este medicamento?

Controlar el ritmo del corazón, de manera frecuente.



Efectos secundarios leves que pueden aparecer

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Náuseas
- Visión borrosa
- Mareos
- Fatiga



Efectos secundarios graves que requieren atención médica

En el 1% de los pacientes (1 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Latidos del corazón peligrosos.
- Daño en el pulmón (asociado al uso de amiodarona),
- Problemas graves en el hígado o tiroides.



Interacciones importantes con medicamentos o alimentos

La Amiodarona interactúa con medicamentos como la Warfarina, la Digoxina y las Estatinas como la Atorvastatina.



Recomendaciones para el uso de los medicamentos de este grupo

- Seguir estrictamente la dosis prescrita.
- Cuando se usa amiodarona se recomienda verificar el ritmo cardíaco y realizar exámenes que permitan evidenciar el funcionamiento adecuado del hígado, los pulmones y la tiroides