

ANTICOAGULANTES ORALES



¿Cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo?

Warfarina, Apixabán, Rivaroxabán, Dabigatran.



¿Cómo actúa el medicamento en el cuerpo?

Disminuyen la capacidad de la sangre para formar coágulos. Ayudan a prevenir trombos peligrosos que pueden causar embolias o infartos.



¿Para qué se usa este medicamento?

Prevenir infartos cerebrales o pulmonares en personas con riesgo.



¿Cuándo NO se debe usar este medicamento?

- Si tienes sangrado activo o enfermedad grave del hígado.
- Si tienes insuficiencia renal grave



¿Qué cuidados debes tener al usar este medicamento?

Evitar golpes, controlar los niveles de coagulación y no automedicarse.



Efectos secundarios leves que pueden aparecer

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Moretones.
- Sangrado leve de encías o nariz.



Efectos secundarios graves que requieren atención médica

En el 1% de los pacientes (1 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Sangrado estomacal o cerebral grave.
- Reacción en piel con coágulos.
- Daño en el hígado.



Interacciones importantes con medicamentos o alimentos

La Warfarina interactúa con muchos antibióticos y alimentos ricos en vitamina K; tener precaución con el uso de alimentos como la espinaca, el brocoli y otros de su grupo.



Recomendaciones para el uso de los medicamentos de este grupo

Evitar golpes y automedicación. Tomar a la misma hora todos los días. Realizar controles según el tipo de anticoagulante y evaluar el riesgo de hemorragias.