

ANTIDIABÉTICOS ORALES



¿Cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo?

- Metformina,
- Acarbosa
- Alogliptina, Linagliptina, Saxagliptina, Sitagliptina, vildagliptina.
- Canagliflozina, Empagliflozina, Dapagliflozina.
- Glibenclamida,



¿Cómo actúa el medicamento en el cuerpo?

Ayudan a bajar el nivel de azúcar en la sangre de distintas formas: mejorando la acción de la insulina, ayudando al páncreas a producir más o eliminando azúcar por la orina.



¿Para qué se usa este medicamento?

Diabetes tipo 2 y prevención de complicaciones de la diabetes



¿Cuándo NO se debe usar este medicamento?

- En insuficiencia renal grave.
- Acidosis metabólica.
- Embarazo (solo si prescripción médica).



¿Qué cuidados debes tener al usar este medicamento?

- Medir azúcar en sangre de manera frecuente.
- Tomar el medicamento con alimentos .



Efectos secundarios leves que pueden aparecer

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Molestias estomacales.
- Aumento en la frecuencia de producción de orina.



Efectos secundarios graves que requieren atención médica

En el 1% de los pacientes (1 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Bajada de azúcar grave.
- Vómito persistente.
- Fiebre.
- Dolor al orinar.



Interacciones importantes con medicamentos o alimentos

Glibenclamida puede causar hipoglucemia con alcohol o betabloqueadores. Metformina: evitar con medios de contraste.



Recomendaciones para el uso de los medicamentos de este grupo

Tomar con alimentos. Controlar niveles de azúcar. Informar síntomas de hipoglucemia.