

ANTILIPÉMICOS (ESTATINAS Y OTROS)



¿Cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo?

Atorvastatina,, Rosuvastatina, Simvastatina,, Ezetimiba, Fluvastatina, Lovastatina, Pravastatina, Fenofibrato

Combinaciones:

- Ezetimiba + Atorvastatina.
- Ezetimiba + Simvastatina.
- Ezetimiba + Rosuvastatina.
- Fenofibrato + Simvastatina.



¿Cómo actúa el medicamento en el cuerpo?

Reduce la cantidad de colesterol malo (LDL) en la sangre al bloquear una enzima en el hígado. También disminuye el riesgo de que se formen placas de grasa en las arterias.



¿Para qué se usa este medicamento?

- Colesterol alto.
- Prevención de infartos y derrames cerebrales.



¿Cuándo NO se debe usar este medicamento?

- Durante el estado de embarazo y lactancia.
- Si tienes enfermedad activa del hígado.



¿Qué cuidados debes tener al usar este medicamento?

Evitar el uso de alcohol en exceso y controlar la función del hígado evaluando los niveles de enzimas hepáticas y colesterol, de manera periódica.



Efectos secundarios leves que pueden aparecer

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Dolor abdominal.
- Diarrea o estreñimiento.
- Dolor de cabeza.
- Acidez estomacal.



Efectos secundarios graves que requieren atención médica


En el 1% de los pacientes (1 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Dolores musculares fuertes.
- Afectación del músculo de las piernas (rabdomiólisis).
- Daño en el hígado.
- Reacciones alérgicas severas.



Interacciones importantes con medicamentos o alimentos

Riesgo de toxicidad muscular al combinar con algunos antibióticos. Evitar el jugo de toronja, ya que puede afectar la disolución del medicamento en el estómago y disminuir su efecto.



Recomendaciones para el uso de los medicamentos de este grupo

Tomar en la noche
Informar al médico si presenta dolores musculares persistentes.