

BRONCODILATADORES Y VASODILATADORES



¿Cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo?

- Salbutamol, Levosalbutamol, Terbutalina, Fenoterol, Clenbuterol, Formoterol, Indacaterol y Salmeterol.
- Bromuro de ipratropio, Tiotropio.

Combinaciones:

- Indacaterol + Glicopirronio.
- Fenoterol + Ipratropio.
- Salbutamol + Ipratropio.
- Olodaterol + Tiotropio.
- Vilanterol + Umeclidinio.
- Formoterol + Beclometasona.
- Salbutamol + beclometasona.
- Formoterol + Budesonida.
- Formoterol + Fluticasona.
- Salmeterol + fluticasona.
- Vilanterol + Fluticasona.
- Formoterol + Mometasona



¿Cómo actúa el medicamento en el cuerpo?

Relaja los músculos de las vías respiratorias para que sea más fácil respirar. Algunos también reducen la inflamación de los pulmones.



¿Para qué se usa este medicamento?

Asma, EPOC, dificultad para respirar.



¿Cuándo NO se debe usar este medicamento?

Cuando se desarrolla tolerancia [Av1] o si se detecta alergia a alguno de los medicamentos de este grupo



¿Qué cuidados debes tener al usar este medicamento?

Usar el inhalador correctamente de acuerdo con la prescripción médica teniendo presente la frecuencia en el uso.



Efectos secundarios leves que pueden aparecer

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Temblor.
- Nerviosismo.
- Tos o ronquera.



Efectos secundarios graves que requieren atención médica

En el 1% de los pacientes (1 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Dolor en el pecho.
- Palpitaciones.
- Dificultad para respirar después del uso.



Interacciones importantes con medicamentos o alimentos

- Evitar duplicar el uso de los medicamentos broncodilatadores.
- Se puede presentar Interacción con medicamentos beta bloqueadores como el Carvedilol.



Recomendaciones para el uso de los medicamentos de este grupo

• Usar correctamente el inhalador.
• No sobrepasar la dosis.
Enjuagar la boca si usa corticoides inhalados, puede generar sensación de sabor metálico o resequedad.