

VASODILADORES Y MEDICAMENTOS PARA INSUFICIENCIA CARDÍACA



¿Cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo?

- Digoxina, Hidralazina
- Minoxidil
- Sacubitrilo + Valsartán,



¿Cómo actúa el medicamento en el cuerpo?

Relaja los vasos sanguíneos y mejora la eficiencia del corazón. Algunos aumentan la fuerza del latido del corazón y otros reducen la resistencia contra la que debe bombear.



¿Para qué se usa este medicamento?

- Insuficiencia cardíaca y síntomas como dificultad para respirar o fatiga.
- Controlar crisis hipertensivas cuando los medicamentos como los inhibidores de la ECA no presentan una adecuada mejoría en los rangos de la presión arterial



¿Cuándo NO se debe usar este medicamento?

Si tienes frecuencia cardíaca baja o alergia conocida a alguno de los medicamentos de este grupo.



¿Qué cuidados debes tener al usar este medicamento?

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- náuseas,
- mareo,
- dolor de cabeza.



Efectos secundarios leves que pueden aparecer

En el 10% de los pacientes (10 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- dolor abdominal,
- diarrea o estreñimiento,
- dolor de cabeza,
- acidez estomacal



Efectos secundarios graves que requieren atención médica


En el 1% de los pacientes (1 de cada 100) se pueden presentar síntomas como:

- Latidos irregulares.
- Sensación de visión borrosa.
- Sensación de debilidad extrema.



Interacciones importantes con medicamentos o alimentos

- El medicamento Digoxina junto con el uso de medicamentos diuréticos puede causar arritmias.
- Tener precaución con el uso concomitante de verapamilo o amiodarona por riesgo de arritmias.



Recomendaciones para el uso de los medicamentos de este grupo

Medir pulso y presión regularmente.
No suspender sin autorización.
Seguir la dieta y el control de líquidos según la indicación médica.